Montevideo, 22 de junio del 2026

**DGS/84/2026**

**Para:** Direcciones Técnicas de prestadores integrales de salud, servicios de vacunación y equipos de salud

**Asunto:** Transición de la estrategia nacional de vacunación antineumocócica hacia PCV20

La Dirección General de la Salud comunica que, a partir del **1.º de julio de 2026**, se implementará la transición completa de la estrategia nacional de vacunación antineumocócica hacia la vacuna antineumocócica conjugada 20 valente (**PCV20**), que pasará a ser la vacuna antineumocócica de referencia para nuevos inicios y continuaciones de esquemas en población infantil, personas adultas y personas con condiciones de riesgo.

Esta actualización forma parte de la revisión programática de la estrategia de prevención de enfermedad neumocócica, considerando la disponibilidad de PCV20, la necesidad de simplificar esquemas, la validez de las dosis previamente administradas con PCV13 y la discontinuidad de nuevos inicios con PPSV23.

Desde el **1.º de julio de 2026**, no deberán iniciarse nuevos esquemas con **PCV13** en el calendario regular ni con **PPSV23**. Las indicaciones previamente cubiertas por PPSV23, así como los esquemas secuenciales **PCV13 + PPSV23**, deberán adecuarse a la nueva estrategia con **PCV20**. Las dosis previas de PCV13 se consideran válidas y no corresponde reiniciar esquemas por el cambio de vacuna.

La aplicación general de la estrategia se resume en la siguiente tabla:

| Situación | Conducta a partir del 1.º de julio de 2026 |
|---|---|
| **Población infantil que inicia esquema regular** | Administrar **PCV20** en las edades previstas para la vacunación antineumocócica del calendario nacional. |
| **Población infantil con esquema iniciado con PCV13** | Continuar con **PCV20**. Las dosis previas de PCV13 son válidas. **No reiniciar esquema.** |
| **Personas adultas con indicación programática** | Administrar **una dosis de PCV20**, según lineamiento vigente. |
| **Personas con condiciones de riesgo que previamente requerían PPSV23 o PCV13 + PPSV23** | Administrar **una dosis de PCV20**, en sustitución de PPSV23 o del esquema secuencial. |
| **Personas con esquema antineumocócico completo previo** | **No revacunar.** Se deberá evaluar solo si existe indicación específica según documento técnico-operativo. |

Las dosis remanentes de **PCV13** serán destinadas a una estrategia específica de intensificación de vacunación, asociada a las jornadas de vacunación en fronteras y a las actividades intensificadas desarrolladas en el marco de la campaña antigripal. PCV13 no deberá utilizarse para nuevos inicios ni para continuidad regular de esquemas antineumocócicos fuera de dicha estrategia.

Se solicita a las Direcciones Técnicas difundir esta actualización a los equipos asistenciales y de vacunación, adecuar los procedimientos institucionales correspondientes y asegurar el correcto registro de las dosis administradas en el Sistema Informático de Vacunas.

Se adjunta documento técnico con los fundamentos epidemiológicos y programáticos, indicaciones, criterios de transición, conducta según antecedente vacunal, aspectos de seguridad, coadministración, registro y monitoreo de la implementación.

Atentamente.

**Dra. Ma. Laura Llambí**
**Directora General de la Salud**
**Ministerio de Salud Pública**