



Vacuna B.C.G.

Conocé más sobre
las vacunas en:



EDADES RECOMENDADAS PARA
Vacuna **B.C.G.**

Única dosis

0 meses

Se recomienda aplicar una
dosis para recién nacidos.



Vacuna B.C.G.

¿Qué enfermedad previene?

La vacuna BCG protege contra la **tuberculosis extrapulmonar**, como la **tuberculosis miliar** (una forma severa de tuberculosis que afecta múltiples órganos) y la **tuberculosis meníngea** en niños pequeños.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria *Mycobacterium tuberculosis*.


¿Cómo se transmite?

La TB se transmite de una persona a otra a través de gotas respiratorias cuando una persona infectada tose o estornuda.



¿Para qué se debe aplicar la vacuna?

La vacuna BCG es la medida de prevención primaria fundamental para prevenir formas graves de tuberculosis, especialmente en niños.



¿Qué esperar luego de vacunarse?

Algunos días después de la vacunación (2-6 semanas) se desarrolla una pequeña pápula que va aumentando de tamaño y puede ulcerarse unas semanas más tarde, y además presentar engrosamiento de los nódulos linfáticos, cervicales o axilares (adenopatía satélite). La pápula persiste durante 2-3 meses y deja una cicatriz. En general, esta vacuna no suele causar fiebre o malestar.

Precauciones

Esta vacuna solo se puede administrar a menores de 5 años. Contraindicada para recién nacidos que pesen menos de 1500 grs y personas con inmunosupresión.

Conocé más sobre las vacunas en www.chlaep.org.uy

