



Vacuna Neumococo 13V

Conocé más sobre las vacunas en:



Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes



EDADES RECOMENDADAS PARA Vacuna Neumococo 13V



1ª dosis	2 meses
2ª dosis	4 meses
Refuerzo	12 meses



Se administra a los 2 y 4 meses de edad, con un refuerzo a los 12 meses.



Vacuna Neumococo 13V

¿Qué enfermedad previene?

El neumococo es una bacteria (*Streptococcus pneumoniae*) produce una gran cantidad de patologías, las cuales se dividen en:

Invasivas: Como **meningitis, neumonía, bacteriemia, artritis séptica**, entre otras.

No invasivas Como **sinusitis, otitis media, neumonía, conjuntivitis**.

¿Cómo se transmite?

El neumococo se transmite a través de secreciones de las vías respiratorias, y coloniza el epitelio de la nasofaringe, de ahí puede llegar a los diferentes tejidos que afecta ya sea a través del torrente sanguíneo o por extensión directa.



¿Para qué se debe aplicar la vacuna?

La vacuna Neumococo es la medida de prevención primaria fundamental para prevenir las formas invasivas y no invasivas de infección por *Streptococcus pneumoniae*.

La vacunación no solo protege a quienes la reciben, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación de la bacteria en la comunidad y protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse.

¿Qué esperar luego de vacunarse?

Después de recibir una vacuna, es frecuente experimentar algunas reacciones leves que indican que el cuerpo está desarrollando inmunidad. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre baja, fatiga y dolores musculares. Estos síntomas suelen ser temporales y desaparecen por sí solos en unos pocos días.



Conocé más sobre las vacunas en www.chlaep.org.uy

