



Vacuna Polio

Conocé más sobre las vacunas en:



Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes



EDADES RECOMENDADAS PARA Vacuna Polio

1ª dosis	2 meses
2ª dosis	4 meses
3ª dosis	6 meses
Refuerzo	5 años

Se recomiendan 3 dosis durante el primer año de vida con un intervalo de 2 meses, a partir de los 2 meses de edad (2, 4 y 6 meses de edad) y una dosis de refuerzo a los 5 años.



Vacuna Polio



¿Qué enfermedad previene?

La **poliomielitis**, comúnmente conocida como polio, es una enfermedad viral grave, altamente contagiosa, causada por el virus de la polio (poliovirus). Este virus puede afectar de forma grave al sistema nervioso y producir una parálisis permanente e incluso la muerte por fallo de la musculatura respiratoria.

¿Cómo se transmite?

La transmisión es oral-oral, por vía fecal-oral, heces o aguas contaminadas.



¿Para qué se debe aplicar la vacuna?

La vacuna Poliomielitis es la medida de prevención primaria fundamental para prevenir la enfermedad.

La vacunación no solo protege a quienes la reciben, sino que también contribuye a la inmunidad colectiva, reduciendo la propagación del virus en la comunidad y protegiendo a aquellos que no pueden vacunarse.



¿Qué esperar luego de vacunarse?

Después de recibir una vacuna, es frecuente experimentar algunas reacciones leves que indican que el cuerpo está desarrollando inmunidad. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre baja, fatiga y dolores musculares. Estos síntomas suelen ser temporales y desaparecen por sí solos en unos pocos días.



Conocé más sobre las vacunas en www.chlaep.org.uy

