



CHLA-EP

COMISIÓN HONORARIA PARA LA LUCHA ANTITUBERCULOSA Y ENFERMEDADES PREVALENTES

LABORATORIO. A. CALMETTE - UNIDAD DE FÁRMACOS

Bvar. Artigas 3175 Tels. 22036732 - 22085844 email: unidad.farmacos@chlaep.org.uy

COMO PREPARAR Y ADMINISTRAR LOS COMPRIMIDOS DISPERSABLES DE USO PEDIÁTRICO

- 1) Colocar en un vaso pequeño el número de comprimidos dispersables indicados por el médico tratante.
- 2) Agregar 5 - 10 ml de agua.
- 3) Agitar suavemente para lograr la dispersión.
- 4) Administrar completamente al paciente en un plazo no mayor a 10 minutos de su reconstitución.
- 5) Enjuagar el vaso con agua y administrar nuevamente.

NOTA: Para el caso de hasta 3 comprimidos, el procedimiento anterior, se puede realizar en jeringa de 10ml, Retirar el émbolo de la jeringa, colocar los comprimidos, aspirar 5-8 ml de agua y agitar suavemente. Luego de la administración al paciente, enjuagar la punta de la jeringa con aprox. 1 ml de agua y administrar.

IMPORTANTE

- A) Recuerde, la preparación reconstituída debe tomarse en un plazo no mayor de 10 minutos de su preparación.
- B) Los comprimidos deben tomarse al menos una hora antes de las comidas o dos horas después.
- C) Los comprimidos no se deben pisar previo a su reconstitución.