



Montevideo, 10 de agosto de 2022

Resolución sobre las recomendaciones para la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH)

En base a la recomendación emitida por la Comisión Nacional Asesora de Vacunas en sesión del 10 de agosto de 2022, se resuelve con respecto a la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH):

1. Aplicar un esquema de **2 dosis**, con un intervalo de **6 meses en mujeres y varones de 11 a 26 años inclusive**, de forma **universal y gratuita sin requerimiento de indicación o receta médica para su administración**.

En caso de personas quienes hayan recibido **una sola dosis** de vacuna contra el VPH y haya transcurrido más de 6 meses, se recomienda completar el esquema con **1 dosis complementaria (completar 2 dosis)** de **forma gratuita sin necesidad de reiniciar el esquema, ni prescripción médica**.

2. En **inmunodeprimidos** comprendidos en edades **de entre 9 a 26 años inclusive**, **se mantiene la recomendación de esquema de 3 dosis** (0, 2 y 6 meses), **con indicación médica y de forma gratuita**. Este grupo de pacientes incluye:

- a. Personas viviendo con VIH independientemente del valor de CD4⁺.
- b. Personas receptoras de trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH) o trasplante de órgano sólido (TOS) en esquema de 3 dosis (previamente mencionado), al año del trasplante.
- c. Pacientes bajo medicamentos biológicos o inmunosupresores (se adjunta anexo listado de los mismos).



Listado de medicamentos biológicos e inmunosupresores:

- Biológicos: Anticuerpos monoclonales como los anti-TNF, como infliximab, adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab. En el caso de anti CD20 como Rituximab (hasta 6 meses luego del último tratamiento), eculizumab.
- Inhibidores de la quinasa Janus o inhibidores de quinasas (JAK) (Tofacitinib, Upadacitinib, ibrutinib, Imatinib, Dasatinib)
- Metotrexate
- Azatioprina
- 6-mercaptopurina
- Cicloserina
- Ciclofosfamida
- Leflunomida
- Interferones
- Prednisona a dosis altas (>2 mg/k/día o >20 mg/día en >10 kg) por un plazo de al menos 2 semanas o dosis equivalentes de otros corticoides
- Micofenolato mofetilo
- Ciclosporina

En casos particulares, dirigir la consulta a: inmunizaciones@msp.gub.uy

Unidad de Inmunizaciones
División Epidemiología
Ministerio de Salud Pública