

Sección A.

Esquemas atrasados, incompletos o no iniciados y recomendaciones especiales en personas sanas

A.1.

Esquemas atrasados, incompletos o no iniciados

A.1.1.

Niño que no recibió vacuna BCG al momento de nacer

Debe recibir dosis única de vacuna si tiene menos de 5 años y si no presenta contraindicaciones. Si tiene 5 o más años, no está indicada.

Las contraindicaciones para recibir vacuna BCG son:

- Recién nacidos con peso menor a 2500 gramos.
- Portadores de inmunodeficiencias congénitas o adquiridas (incluye infección por VIH, leucemia, linfomas y otras enfermedades malignas).
- Supresión de la respuesta inmunológica por fármacos o RT.

En hijos de madres con VIH, no se administra BCG hasta contar con 2 PCR negativas en el caso de mujer con carga viral indetectable, o 3 PCR negativas en caso de mal control de la enfermedad materna (carga viral detectable o desconocida).

A.1.2.

Niño mayor de 2 meses y menor de 5 años de edad con esquema de vacunación no iniciado o atrasado

Se debe administrar o completar, sin considerar intervalos máximos:

Vacuna BCG: hasta los 4 años de edad inclusive.

Vacuna pentavalente (DPT, HB, Hib): cuatro dosis. La 1ª, 2ª y 3ª dosis con un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una, según corresponda. La 4ª dosis nunca debe administrarse antes de los 15 meses de edad y respetando un intervalo mínimo de 2 meses con la 3ª dosis.

VPI: tres dosis, con un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una, según corresponda.

VCN13: tres dosis, la 1ª y 2ª dosis con un intervalo mínimo de 2 meses entre cada vacuna, según corresponda. La 3ª dosis nunca debe administrarse antes del año de edad y respetando un intervalo mínimo de 2 meses con la 2ª dosis.

Vacuna anti varicela: una dosis a partir de los 12 meses de edad.

Vacuna anti SRP: una dosis a partir de los 12 meses de edad.

Vacuna anti HA: completar dos dosis separadas por un intervalo mínimo de 6 meses, comenzando a los 15 meses.

A.1.3.

Niño con contraindicación absoluta para recibir vacunas con componente pertussis celular

Aquellos niños con antecedente de encefalopatía dentro de los 7 días posteriores a la inmunización con DPT, DPaT, o dpaT, tienen contraindicación absoluta para recibir el componente pertussis.

En estos casos se debe administrar:

Vacuna anti HB: completar esquema de tres dosis con intervalo mínimo de 2 meses entre cada una. Los intervalos mínimos entre dosis son de 1 mes entre la 1ª y 2ª dosis, 2 meses entre la 2ª y la 3ª, y de 4 meses entre la 1ª y la 3ª dosis.

Vacuna anti DT pediátrica: completar esquema de cuatro dosis con intervalo mínimo de 2 meses entre cada una. La 4ª dosis nunca debe administrarse antes de los 15 meses de edad, y respetando un intervalo mínimo de 2 meses luego de la 3ª dosis.

Vacuna anti Hib: completar esquema de cuatro dosis con intervalo mínimo de 2 meses entre cada una. La 4ª dosis nunca debe administrarse antes de los 15 meses de edad y respetando un intervalo mínimo de 2 meses luego de la 3ª dosis.

En niños de un año de edad o más, aplicar una sola dosis.

A.1.4.

Niño entre 5 y 10 años de edad no vacunado o que no completó la vacunación

Se debe administrar o completar, sin considerar intervalos máximos:

Vacuna anti DPT: tres dosis, respetando un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una. Considerar entre las tres dosis requeridas del esquema básico, las recibidas previamente como vacuna pentavalente o vacuna DPT. De tener tres o cuatro dosis de pentavalente, debe recibir una dosis de refuerzo.

A los 5 años se utiliza vacuna DPT. A partir de los 6 años se utiliza dpaT. La vacuna pentavalente no se administra a los niños de 5 años o más.

VPI: cuatro dosis, respetando un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una.

Vacuna anti varicela: dos dosis, respetando un intervalo mínimo de 3 meses entre cada una.

Vacuna anti SRP: dos dosis, respetando un intervalo mínimo de 1 mes entre cada una.

Vacuna anti HA: dos dosis, respetando un intervalo mínimo de 6 meses entre cada una.

Vacuna anti HB: tres dosis. Considerar las recibidas previamente como vacuna pentavalente. El intervalo mínimo entre la 1ª y 2ª dosis es de 1 mes, de 2 meses entre la 2ª y la 3ª, y de 4 meses entre la 1ª y la 3ª dosis.

A.1.5.

Adolescente de 11 a 18 años no vacunado o que no completó vacunación

Se debe administrar o completar, sin considerar intervalos máximos:

Vacuna anti dpaT: tres dosis, con esquema 0, 1 y 12 meses. En caso de esquemas incompletos, se deben completar las tres dosis respetando un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una. Si nunca recibió vacuna dpaT, una de las dosis para completar el esquema debe ser con esta vacuna y el resto con vacuna dT. En caso de adolescentes embarazadas, una de las dosis debe corresponder a la vacuna dpaT.

VPI: tres dosis, con un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una.

Vacuna anti varicela: dos dosis, respetando un intervalo mínimo de 3 meses entre cada una antes de los 13 años y de 1 mes luego de esta edad.

Vacuna anti SRP: dos dosis, respetando un intervalo mínimo de 1 mes entre cada una.

Vacuna anti HB: tres dosis. Considerar las recibidas previamente como vacuna pentavalente. El intervalo mínimo entre 1ª y 2ª dosis es de 1 mes, y de 2 meses entre la 2ª y la 3ª dosis. Deben transcurrir al menos 6 meses entre la administración de la 1ª y la 3ª dosis.

Vacuna anti VPH: se administra la vacuna cuadrivalente, con un esquema de 2 dosis hasta los 14 años inclusive (0 y 6 meses). A partir de los 15 años, se administra en un esquema de 3 dosis (0, 2 y 6 meses).

A.1.6.

Mayor de 18 años no vacunado o que no completó vacunación

Se debe administrar o completar, sin considerar intervalos máximos:

Vacuna anti dT: tres dosis, con esquema 0, 1 y 12 meses. En caso de esquemas incompletos, se deben completar las tres dosis respetando un intervalo mínimo de 2 meses entre cada una.

Revacunar cada 10 años.

De no haberse administrado una dosis de refuerzo, pero contando con el esquema previo completo, se debe administrar 1 dosis si han pasado más de 10 años desde la última.

Las embarazadas deben recibir una dosis de vacuna dpaT **en cada embarazo**.

Vacuna anti SRP: dos dosis de vacuna para todos los nacidos después del año 1967, con un intervalo mínimo de 1 mes entre cada una.