



¿Dónde puede recibir la vacuna?

En cualquier vacunatorio público o privado del país.

Conocé más sobre las vacunas en:



Vacuna VPH



Comisión Honoraria para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes

OPS

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

EDADES RECOMENDADAS:

1 dosis entre 11 y 26 años

**Para mujeres y hombres.
Gratuita y sin indicación médica.**

En situaciones especiales (determinadas patologías), la indicación puede extenderse hasta los 45 años, con receta médica, que indicará las dosis correspondientes

Conocé más sobre las vacunas en

www.chlaep.org.uy

¿Qué enfermedad previene?

Lesiones ano-genitales o en la boca (verrugas, condilomas). Generalmente asintomáticos pero pueden causar picazón o sangrado.

Lesiones premalignas o cáncer de cuello uterino, ano, pene, boca y garganta.

Es la principal causa de cáncer de cuello uterino en mujeres.



¿Cómo se transmite?

**Por contacto de piel a piel.
Vía sexual (vaginal, anal u oral).**

¿Para qué se debe aplicar la vacuna?

La vacuna nonavalente contra el VPH es una inmunización preventiva de segunda generación que protege frente a nueve genotipos del virus (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58).

Previene el desarrollo de diversos tipos de cáncer y otras enfermedades asociadas, y contribuye a reducir la circulación del virus en la población.

¿Qué esperar luego de vacunarse?

Después de recibir una vacuna, es frecuente experimentar algunas reacciones leves que indican que el cuerpo está desarrollando inmunidad. Estas reacciones pueden incluir dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, fiebre, fatiga y dolores musculares.

Estos síntomas suelen ser temporales y desaparecen por sí solos en unos pocos días. Otros efectos adversos que pueden ser más graves son muy infrecuentes

